Grand Bombyle (*Bombylius major*)

Il s'agit très certainement du plus commun et du plus connu des bombyles de notre région. Son vol stationnaire, quand il butine, fait penser à un colibri. C'est un parasite d'abeilles solitaires. Il est courant de voir la femelle pondre en vol à l'entrée des galeries.

9 à 11 mm

Famille : Bombyliidae



HABITAT

Très largement répandu en Europe, le Grand Bombyle s'observe dans de très nombreux habitats. Il peut être vu dans les parcs et jardins, les clairières, allées et lisières forestières ainsi que dans tous les autres milieux ouverts comme les bords de champs ou les friches. Il se trouvera très souvent non loin des bourgades d'abeilles solitaires.

PHENOLOGIE

Ce bombyle est une espèce printanière qui est observable principalement de mars à mai.

IDENTIFICATION

Les bombyles sont identifiables rapidement par leur longue trompe (rostre) dirigée vers l'avant de leur tête. *Bombylius major* se détermine par la présence de la bande noire sur ses ailes, avec la cellule R1 à son extrémité qui est entièrement noire, contrairement à d'autres espèces.



Si vous observez cette espèce, n'oubliez pas de renseigner votre observation dans la base de données **https://clicnat.fr/**

Fiche espèce Bombylius major - BARBIER S, 2025

Comparatif avec d'autres espèces :

Dans la famille des Bombyliidae, une quinzaine d'espèces sont actuellement connues en région et plusieurs dans le genre *Bombylius*. La plupart des espèces sont faciles à distinguer par la coloration des ailes ou la forme du rostre. La période d'observation peut également permettre de réduire le nombre d'espèces.

petites tâches noires sur les ailes

Bombylius discolor

Bombylius major

Ailes transparentes

Bombylius venosus / minor

Le genre *Bombylius* est le plus précoce, la plupart des autres genres s'observent à partir du mois de mai

Absence de rostre allongé vers l'avant

forme de la bande noire différente

Hemipenthes morio

Cofinancé par l'Union européenne