



LISTE DES ESPÈCES DE COCCINELLES CONNUES OU POTENTIELLES EN PICARDIE

| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Méthode d'identification | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| | | À vue sur le terrain ou sur photo | À la loupe sur le terrain ou sur photo de qualité | À la loupe binoculaire |
| <i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Adalie à deux points | | | |
| <i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Adalie à dix points | | | |
| <i>Adalia conglomerata</i> (Linnaeus, 1758) | | P | | |
| <i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle ocellée | P | | |
| <i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle des roseaux | P | | |
| <i>Aphidecta oblitterata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle de l'épicea | | | |
| <i>Brumus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à virgule | | | |
| <i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Calvia à dix points blancs | | | |
| <i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Calvia à quatorze points blancs | | | |
| <i>Calvia quindecimguttata</i> (Fabricius, 1777) | Calvia à quinze points blancs | P | | |
| <i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle des landes | | | |
| <i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1790) | Coccinelle des saules | | | |
| <i>Clitostethus arcuatus</i> (Rossi, 1794) | | | P | |
| <i>Coccidula rufa</i> (Herbst, 1783) | Coccidule des marais | P | | |
| <i>Coccidula scutellata</i> (Herbst, 1783) | Coccidule tachetée | P | | |
| <i>Coccinella septempunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à sept points | | | |
| <i>Coccinella undecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à onze points | | | |
| <i>Coccinella hieroglyphica</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à hiéroglyphe | P | | |
| <i>Coccinella magnifica</i> (Redtenbacher, 1843) | Coccinelle des fourmilières | | P | |
| <i>Coccinella quinquepunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à cinq points | P | | |
| <i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinule | P | | |
| <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> (Mulsant, 1853) | | | | P ou I |
| <i>Cynegetis impunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | | | P ou I |
| <i>Exochomus nigromaculatus</i> (Goeze, 1777) | Coccinelle noire | P | | |
| <i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Grande coccinelle orange | | | |
| <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) | Coccinelle asiatique | | | |
| <i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763) | Coccinelle des pins | | | |
| <i>Henosepilachna argus</i> (Geoffroy, 1762) | Coccinelle de la bryone | | | |
| <i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à treize points | P | | |
| <i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777) | Coccinelle des friches | | | |
| <i>Hippodamia notata</i> (Laicharting, 1781) | | P | | |
| <i>Hippodamia septemmaculata</i> (De Geer, 1775) | | P | | |
| <i>Hippodamia undecimnotata</i> (Schneider, 1792) | | P | | |
| <i>Hyperaspis campestris</i> (Herbst, 1783) | | P | | |
| <i>Hyperaspis pseudopustulata</i> (Mulsant, 1853) | | P | | |
| <i>Myrrha octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle des cimes | | | |
| <i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle zébrée | P | | |
| <i>Nephus bipunctatus</i> (Kugelann, 1794) | | | | P ou I |
| <i>Nephus bisignatus</i> (Boheman, 1850) | | | | P ou I |
| <i>Nephus redtenbacheri</i> (Mulsant, 1846) | | | | P ou I |
| <i>Nephus quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783) | | | P | |
| <i>Oenopia impustulata</i> (Linnaeus, 1758) | | P | | |
| <i>Oenopia lyncea</i> (Olivier, 1808) | | P | | |
| <i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle rose | | | |
| <i>Platynaspis luteorubra</i> (Goeze, 1777) | Coccinelle fulgurante | P | | |
| <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à échiquier | | | |
| <i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à vingt-deux points | | | |
| <i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792) | Rhyzobie des arbres | P | | |
| <i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787) | Rhyzobie des friches | P | | |
| <i>Rhyzobius forestieri</i> (Mulsant, 1853) | | | | P ou I |
| <i>Rhyzobius lophanthae</i> (Blaisdell, 1892) | | | | P ou I |
| <i>Rodolia cardinalis</i> (Mulsant, 1850) | | | P | |
| <i>Scymnus abietis</i> (Paykull, 1798) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus apetzi</i> (Mulsant, 1846) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus auritus</i> (Thunberg, 1795) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus ater</i> (Kugelann, 1794) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus bivulnerus</i> (Capra & Fürsch, 1967) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus ferrugatus</i> (Moll, 1785) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus frontalis</i> (Fabricius, 1787) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus haemorrhoidalis</i> (Herbst, 1797) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus limbatus</i> (Stephens, 1831) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus mimulus</i> (Capra & Fürsch, 1967) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus nigrinus</i> (Kugelann, 1794) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus pallipediformis apetzoides</i> (Capra & Fürsch, 1967) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1778) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus rufipes</i> (Fabricius, 1798) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus subvillosus</i> (Goeze, 1777) | | | | P ou I |
| <i>Scymnus suturalis</i> (Thunberg, 1795) | | | | P ou I |
| <i>Sospita vigintiguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle de l'aulne | P | | |
| <i>Stethorus punctillum</i> (Weise, 1891) | | | | P ou I |
| <i>Subcoccinella vigintiquatuoropunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à 24 points | | | |
| <i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à seize points | | | |
| <i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761) | Petite coccinelle orange | | | |

P = Photo nécessaire pour la validation de la donnée, si possible de bonne qualité et sous différents angles (dessus, côté, face et dessous)
 P ou I = Photo prise à la loupe binoculaire ou individu prélevé et transmis à Picardie Nature nécessaires à la validation de la donnée